

Tab. 3. Wichtige Nektar- und Pollenpflanzen der Hummeln (*Bombus*) (nach Carvell 2002; Carvell et al. 2006a; Gouison und Darvill 2004; Gouison et al. 2005; Iye et al. 2009). Die Pflanzenarten sind alphabetisch nach der Pflanzenfamilie und innerhalb der Familie nach ihrer Blütezeit geordnet. Nomenklatur, Blütezeit und Standort nach Lauber und Wagner (2007). N=Nektar, P=Pollen

| Pflanzenart | | Pflanzenfamilie | Ressource | Blütezeit (Monat) | Standort |
|------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------|-------------------|--|
| <i>Centaurea nigra</i> | Schwarze Flockenblume | Asteraceae | NP | 7–10 | Weiden, Wiesen |
| <i>Centaurea scabiosa</i> | Skabiosen-Flockenblume | Asteraceae | NP | 6–8 | Weiden, Wiesen |
| <i>Cirsium arvense</i> | Acker-Kratzdistel | Asteraceae | NP | 7–9 | Weiden, Wiesen, Wegränder |
| <i>Cirsium vulgare</i> | Gemeine Kratzdistel | Asteraceae | NP | 7–9 | Weiden, Wiesen, Wegränder |
| <i>Hypochoeris radicata</i> | Wiesen-Ferkelkraut | Asteraceae | P | 6–10 | Wiesen, Raine |
| <i>Leucanthemum vulgare</i> | Gemeine Margerite | Asteraceae | P | 5–10 | Fettwiesen, Weiden |
| <i>Serratula tinctoria</i> | Färberscharte | Asteraceae | P | 7–9 | Riedwiesen, lichte Wälder |
| <i>Taraxacum officinale</i> | Gebräuchlicher Löwenzahn | Asteraceae | NP | 4–10 | Fettwiesen, Wegränder |
| <i>Echium vulgare</i> | Gewöhnlicher Natterkopf | Boraginaceae | NP | 5–10 | Kiesgruben, Wegränder, Ruderaflächen |
| <i>Symphytum officinale</i> | Echter Wallwurz | Boraginaceae | NP | 5–8 | Feuchte Wiesen, Gräben |
| <i>Calystegia sepium</i> | Zaunwinde | Convolvulaceae | N | 6–9 | Hecken, Waldschläge, Gärten |
| <i>Dipsacus fullonum</i> | Wilde Karde | Dipsacaceae | NP | 7–8 | Wegränder, Ufer |
| <i>Knautia arvensis</i> | Acker-Witwenblume | Dipsacaceae | NP | 5–9 | Wiesen, Raine, Wegränder |
| <i>Succisa pratensis</i> | Abbisskraut | Dipsacaceae | NP | 7–9 | Moorwiesen, Heiden |
| <i>Calluna vulgaris</i> | Heidekraut | Ericaceae | NP | 8–10 | Zwergstrauchheiden, Moore, magere Weiden |
| <i>Erica sp.</i> | Glockenheide | Ericaceae | P | 7 | Föhrenwälder Zwergstrauchheiden |
| <i>Anthyllis vulneraria</i> | Gemeiner Wundklee | Fabaceae | NP | 5–9 | Kalkhaltige Trockenwiesen |
| <i>Lathyrus pratensis</i> | Wiesen-Platterbse | Fabaceae | NP | 6–7 | Wiesen, Wegränder |
| <i>Lotus corniculatus</i> | Gewöhnlicher Hornklee | Fabaceae | NP | 5–7 | Fettwiesen, Wegränder |
| <i>Melilotus sp.</i> | Honigklee | Fabaceae | NP | 6–8 | Wegränder, Kiesgruben |
| <i>Onobrychis viciifolia</i> | Saat-Esparsette | Fabaceae | NP | 5–8 | Trockenwiesen, Böschungen |
| <i>Trifolium pratense</i> | Wiesenklee | Fabaceae | NP | 5–10 | Wiesen |
| <i>Trifolium repens</i> | Kriechender Klee | Fabaceae | NP | 5–9 | Kunstrasen, Wegränder |
| <i>Vicia cracca</i> | Vogel-Wicke | Fabaceae | NP | 6–8 | Wiesen, Äcker |
| <i>Vicia sepium</i> | Zaunwicke | Fabaceae | NP | 4–7 | Wiesen, Wälder |
| <i>Hypericum perforatum</i> | Gemeines Johanniskraut | Hypericaceae | P | 6–9 | Trockenwiesen, Waldränder |
| <i>Ajuga reptans</i> | Kriechender Günsel | Lamiaceae | NP | 4–7 | Wiesen, Wälder |
| <i>Ballota nigra</i> | Schwarznessel | Lamiaceae | NP | 6–8 | Wegränder, Schuttplätze |
| <i>Glechoma hederacea</i> | Gundelrebe | Lamiaceae | NP | 4–5 | Wiesen, Gebüsche |

Tab. 3. Fortsetzung

| Pflanzenart | | Pflanzenfamilie | Ressource | Blütezeit (Monat) | Standort |
|----------------------------|-----------------------|------------------|-----------|-------------------|-------------------------------|
| <i>Lamium album</i> | Weisse Taubnessel | Lamiaceae | NP | 4–9 | Hecken, Wegränder |
| <i>Lamium purpureum</i> | Acker-Taubnessel | Lamiaceae | NP | 3–10 | Äcker, Gärten, Weinberge |
| <i>Prunella vulgaris</i> | Gemeine Brunelle | Lamiaceae | NP | 6–9 | Wiesen, Weiden |
| <i>Stachys officinalis</i> | Gebräuchliche Betonie | Lamiaceae | NP | 7–9 | Magerwiesen, Gebüsche |
| <i>Stachys sylvatica</i> | Wald-Ziest | Lamiaceae | NP | 6–9 | Wälder, Hecken |
| <i>Thymus polytrichus</i> | Vielhaariger Thymian | Lamiaceae | NP | 6–9 | Felsen, Weiden |
| <i>Thymus pulegioides</i> | Arznei-Thymian | Lamiaceae | NP | 4–8 | Magere Wiesen, Weiden |
| <i>Papaver rhoeas</i> | Klatsch-Mohn | Papaveraceae | P | 5–9 | Äcker, Schuttplätze |
| <i>Potentilla erecta</i> | Blutwurz | Rosaceae | NP | 6–9 | Moore, Wiesen, Weiden |
| <i>Prunus sp.</i> | Steinobst | Rosaceae | NP | 4–5 | Obstgärten, Hausgärten |
| <i>Rubus fruticosus</i> | Brombeeren | Rosaceae | NP | 5–7 | Hecken, Waldränder |
| <i>Salix cinerea</i> | Grau-Weide | Salicaceae | NP | 3–4 | Tümpel, Gräben |
| <i>Odonites vernus</i> | Später Augentrost | Scrophulariaceae | NP | 8–10 | Äcker, Strassenränder, Weiden |
| <i>Rhinanthus minor</i> | Kleiner Klappertopf | Scrophulariaceae | NP | 5–8 | Magerwiesen, Flachmoore |